

Сведения об инфекционной и паразитарной заболеваемости в Костромской области за октябрь 2013-12гг.

	2013						2012						рост, снижение ( % )		
	всего	на 100 тыс.	от 0 до 17 лет	на 100 тыс.	от 0 до 14 лет	на 100 тыс.	всего	на 100 тыс.	от 0 до 17 лет	на 100 тыс.	от 0 до 14 лет	на 100 тыс.	всего	от 0 до 17 лет	от 0 до 14 лет
Брюшной тиф	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Другие сальмонеллезные инфекции	10	1,51	2	1,68	0	0,00	12	1,80	2	1,70	2	2,03	- 2 сл.	=	- 2 сл.
Бактериальная дизентерия (шигеллез)	4	0,60	0	0,00	0	0,00	4	0,60	4	3,40	4	4,05	=	- 4 сл.	- 4 сл.
ОКИ, вызванные установленными возбудителями	55	8,31	30	25,16	28	27,85	26	3,90	9	7,64	9	9,12	в 2,1р.	в 3,3р.	в 3,1р.
ОКИ, вызван. неустановлен. возбудителями	218	32,94	105	88,05	96	95,49	201	30,16	115	97,61	105	106,42	9,2%	-9,8%	-10,3%
Острый паралитический полиомиелит, включая ассоциированный с вакциной	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Острые вялые параличи	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Энтеровирусные инфекции	3	0,45	3	2,52	3	2,98	1	0,15	1	0,85	1	1,01	+ 2 сл.	+ 2 сл.	+ 2 сл.
из них: энтеровирусный менингит	2	0,30	2	1,68	2	1,99	1	0,15	1	0,85	1	1,01	+ 1 сл.	+ 1 сл.	+ 1 сл.
Острые вирусные гепатиты – всего	2	0,30	0	0,00	0	0,00	6	0,90	3	2,55	3	3,04	- 4 сл.	- 3 сл.	- 3 сл.
из них: острый гепатит А	1	0,15	0	0,00	0	0,00	3	0,45	3	2,55	3	3,04	- 2 сл.	- 3 сл.	- 3 сл.
острый гепатит В	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
острый гепатит С	1	0,15	0	0,00	0	0,00	2	0,30	0	0,00	0	0,00	- 1 сл.	-	-
острый гепатит Е	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,15	0	0,00	0	0,00	- 1 сл.	-	-
Хронические вирусные гепатиты (впервые)	20	3,02	0	0,00	0	0,00	29	4,35	0	0,00	0	0,00	-30,6%	-	-
из них: хронический гепатит В	4	0,60	0	0,00	0	0,00	6	0,90	0	0,00	0	0,00	- 2 сл.	-	-
хронический гепатит С	16	2,42	0	0,00	0	0,00	23	3,45	0	0,00	0	0,00	-29,9%	-	-
Носительство возбудителя вирусного гепатита В	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,15	0	0,00	0	0,00	- 1 сл.	-	-
Дифтерия	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Коклюш	2	0,30	2	1,68	2	1,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00	+ 2 сл.	+ 2 сл.	+ 2 сл.
Корь	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Краснуха	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Паротит эпидемический	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Менингококковая инфекция	1	0,15	1	0,84	1	0,99	1	0,15	1	0,85	1	1,01	=	=	=
из нее: генерализованные формы	1	0,15	1	0,84	1	0,99	1	0,15	1	0,85	1	1,01	=	=	=
Ветряная оспа	228	34,45	214	179,5	206	204,9	282	42,32	269	228,33	261	264,53	-18,6%	-21,4%	-22,5%
Туляремия	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Сибирская язва	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Бруцеллез, впервые выявленный	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Вирусные и геморрагические лихорадки	5	0,76	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	+ 5 сл.	-	-
из них:лихорадка Западного Нила	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Крымская гемор. лихорадка	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
ГЛПС	5	0,76	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	+ 5 сл.	-	-
Клещевой весенне-летний энцефалит	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма)	1	0,15	0	0,00	0	0,00	2	0,30	0	0,00	0	0,00	- 1 сл.	-	-
Псевдотуберкулез	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Легтоспироз	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Бешенство	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Укусы, ослонения, оцарапывания животными	70	10,58	17	14,26	16	15,92	79	11,85	24	20,37	23	23,31	-10,8%	-30,0%	-31,7%
Укусы клещами	3	0,45	1	0,84	1	0,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00	+ 3 сл.	+ 1 сл.	+ 1 сл.
Риккетсиозы	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
из них: эпидемический сыпной тиф	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
болезнь Бриля	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
лихорадка Ку	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
сибирский клещевой тиф	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
астраханская пятнистая лихорадка	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
гранулоцитарный анаплазмоз человека	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
моноцитарный эрлихиоз человека	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Педикулез	29	4,38	24	20,13	20	19,89	50	7,50	44	37,35	40	40,54	-41,6%	-46,1%	-50,9%
Туберкулез (впервые выявленный) активные формы	13	1,96	0	0,00	0	0,00	28	4,20	2	1,70	2	2,03	-53,2%	- 2 сл.	- 2 сл.
в т.ч. туберкулез органов дыхания	13	1,96	0	0,00	0	0,00	25	3,75	1	0,85	1	1,01	-47,6%	- 1 сл.	- 1 сл.
из них бациллярные формы	4	0,60	0	0,00	0	0,00	13	1,95	0	0,00	0	0,00	- 9 сл.	-	-
Сифилис (впервые выявленный) все формы	9	1,36	0	0,00	0	0,00	11	1,65	1	0,85	0	0,00	-17,6%	-	-
Гонококковая инфекция	16	2,42	1	0,84	1	0,99	20	3,00	1	0,85	0	0,00	-19,4%	=	+ 1 сл.
Болезнь, вызванная ВИЧ и бессимптомный инфекционный статус, вызванный ВИЧ	17	2,57	0	0,00	0	0,00	5	0,75	0	0,00	0	0,00	+ 12 сл.	-	-
ОРВИ	19640	2967,83	15515	13010,2	14298	14222,2	21088	3164,51	16444	13957,59	13747	13933,0	-6,2%	-6,8%	2,1%
Грипп	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Пневмония (внебольничная)	165	24,93	94	78,82	85	84,55	151	22,66	60	50,93	54	54,73	10,0%	54,8%	54,5%
Малярия впервые выявленная	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Трихинеллез	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Поствакцинальные осложнения	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-