Сведения об инфекционной и паразитарной заболеваемости в Костромской области за **ноябрь** 2013-12гг.

	2013						2012						рост, снижение (%)		
	всего	на 100 тыс.	от 0 до 17 лет	на 100 тыс.	от 0 до 14 лет	на 100 тыс.	всего	на 100 тыс.	от 0 до 17 лет	на 100 тыс.	от 0 до 14 лет	на 100 тыс.	всего	от 0 до 17 лет	от 0 до 14 лет
Брюшной тиф	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Другие сальмонеллезные инфекции	11	1,66	5	4,19	5	4,97	6	0,90	3	2,55	3	3,04	+ 5 сл.	+ 2 сл.	+ 2 сл.
Бактериальная дизентерия (шигеллез)	5	0,76	3	2,52	3	2,98	69	10,35	52	44,14	52	52,70	- 64 сл.	- 49 сл.	- 49 сл.
ОКИ, вызванные установленными возбудителями	60	9,07	40	33,54	38	37,80	36	5,40	25	21,22	24	24,32	67,8%	58,1%	55,4%
ОКИ, вызван. неустановлен. возбудителями	215	32,49	148	124,11	140	139,26	228	34,21	130	110,34	125	126,69	-5,0%	12,5%	9,9%
Острый паралитический полиомиелит, включая ассоциированный с вакциной	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Острые вялые параличи	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,15	1	0,85	1	1,01	- 1 сл.	- 1 сл.	- 1 сл.
Энтеровирусные инфекции	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
из них: энтеровирусный менингит	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Острые вирусные гепатиты – всего	3	0,45	0	0,00	0	0,00	7	1,05	0	0,00	0	0,00	- 4 сл.	-	-
из них: острый гепатит А	1	0,15	0	0,00	0	0,00	4	0,60	0	0,00	0	0,00	- 3 сл.	-	-
острый гепатит В	1	0,15	0	0,00	0	0,00	1	0,15	0	0,00	0	0,00	=	-	-
острый гепатит С	1	0,15	0	0,00	0	0,00	2	0,30	0	0,00	0	0,00	- 1 сл.	-	-
острый гепатит Е	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,15	0	0,00	0	0,00	- 1 сл.	-	-
Хронические вирусные гепатиты (впервые	27	4,08	0	0,00	0	0,00	25	3,75	1	0,85	1	1,01	8,8%	-	-
из них: хронический гепатит В	4	0,60	0	0,00	0	0,00	3	0,45	0	0,00	0	0,00	+ 1 сл.	-	-
хронический гепатит С	23	3,48	0	0,00	0	0,00	21	3,15	0	0,00	0	0,00	10,3%	-	-
Носительство возбудителя вирусного гепатита В	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,15	0	0,00	0	0,00	- 1 сл.	-	-
Дифтерия	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Коклюш	4	0,60	4	3,35	4	3,98	1	0,15	1	0,85	1	1,01	+ 3 сл.	+ 3 сл.	+ 3 сл.
Корь	3	0,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Краснуха	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Паротит эпидемический	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Менингококковая инфекция	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	=	=	=
из нее: генерализованные формы	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	=	=	=
Ветряная оспа	317	47,90	297	249,1	286	284,5	360	54,02	350	297,08	335	339,53	-11,3%	-16,2%	-16,2%
Туляремия	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Сибирская язва	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Бруцеллез, впервые выявленный	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Вирусные и геморрагические лихорадки	8	1,21	0	0,00	0	0,00	3	0,45	0	0,00	0	0,00	+ 5 сл.	-	-
из них:лихорадка Западного Нила	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Крымская гемор. лихорадка	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
ГЛПС	8	1,21	0	0,00	0	0,00	3	0,45	0	0,00	0	0,00	+ 5 сл.	-	-
Клещевой весенне-летний энцефалит	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма)	3	0,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	+ 3 сл.	-	-
Псевдотуберкулез	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Лептоспироз	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Бешенство	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Укусы, ослюнения, оцарапывания животными	66	9,97	14	11,74	13	12,93	70	10,50	12	10,19	12	12,16	-5,1%	15,3%	6,3%
Укусы клещами	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Риккетсиозы	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
из них: эпидемический сыпной тиф	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
болезнь Брилля	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
лихорадка Ку	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
сибирский клещевой тиф	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
астраханская пятнистая лихорадка	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
гранулоцитарный анаплазмоз человека	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
моноцитарный эрлихиоз человека	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Педикулез	24	3,63	20	16,77	19	18,90	45	6,75	38	32,25	36	36,49	-46,3%	-48,0%	-48,2%
Туберкулез (впервые выявленный) активные формы	12	1,81	1	0,84	1	0,99	20	3,00	2	1,70	1	1,01	-39,6%	- 1 сл.	=
в т.ч. туберкулез органов дыхания	12	1,81	1	0,84	1	0,99	20	3,00	2	1,70	1	1,01	-39,6%	- 1 сл.	=
из них бациллярные формы	3	0,45	0	0,00	0	0,00	10	1,50	0	0,00	0	0,00	-69,8%	-	-
Сифилис (впервые выявленный) все формы	5	0,76	0	0,00	0	0,00	16	2,40	0	0,00	0	0,00	-68,5%	-	-
Гонококковая инфекция	15	2,27	2	1,68	1	0,99	10	1,50	0	0,00	0	0,00	51,0%	+ 2 сл.	+ 1 сл.
Болезнь, вызванная ВИЧ и бессимптомный инфекционный статус, вызванный ВИЧ	11	1,66	1	0,84	1	0,99	12	1,80	0	0,00	0	0,00	-7,7%	+ 1 сл.	+ 1 сл.
ОРВИ	16251	2455,71	13197	11066,4	12322	12256,7	19269	2891,55	15355	13033,26	14075	14265,4	-15,1%	-15,1%	-14,1%
Грипп	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Пневмония (внебольничная)	249	37,63	153	128,30	133	132,29	189	28,36	104	88,27	97	98,31	32,7%	45,3%	34,6%
Малярия впервые выявленная	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Трихинеллез	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Поствакцинальные осложнения	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-