

| | 2023 | | | | | | 2022 | | | | | | рост, снижение (%) | | |
|---|-------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|
| | всего | на 100 тыс. | от 0 до 17 лет | на 100 тыс. | от 0 до 14 лет | на 100 тыс. | всего | на 100 тыс. | от 0 до 17 лет | на 100 тыс. | от 0 до 14 лет | на 100 тыс. | всего | от 0 до 17 лет | от 0 до 14 лет |
| Брюшной тиф | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Другие сальмонеллезные | 6 | 0,97 | 3 | 2,36 | 3 | 2,79 | 17 | 2,71 | 8 | 6,46 | 8 | 7,33 | -2,8р. | -5сл. | -5сл. |
| Бактериальная дизентерия | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| ОКИ, вызванные уст. возбуд. | 38 | 6,12 | 33 | 25,96 | 31 | 28,85 | 53 | 8,43 | 47 | 37,95 | 47 | 43,08 | -27,4% | -31,6% | -33% |
| ОКИ, вызван. неуст. возбуд. | 87 | 14,01 | 66 | 51,93 | 64 | 59,57 | 113 | 17,98 | 79 | 63,80 | 76 | 69,66 | -22,1% | -18,6% | -14% |
| Острый паратифический | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Острые вялые параличи | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Энтеровирусные инфекции | 1 | 0,16 | 1 | 0,79 | 1 | 0,93 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | +1сл. | +1сл. | +1сл. |
| из них: энтеровирусный | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Острые вирусные гепатиты – | 7 | 1,13 | 1 | 0,79 | 1 | 0,93 | 1 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | +6сл. | +1сл. | +1сл. |
| из них: острый гепатит А | 5 | 0,81 | 1 | 0,79 | 1 | 0,93 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | +5сл. | +1сл. | +1сл. |
| острый гепатит В | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| острый гепатит С | 2 | 0,32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | +2сл. | - | - |
| острый гепатит Е | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Хронические вирусные гепатиты | 17 | 2,74 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 31 | 4,93 | 1 | 0,81 | 0 | 0,00 | -44,5% | - | - |
| из них: хронический гепатит В | 4 | 0,64 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1сл. | - | - |
| хронический гепатит С | 13 | 2,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 26 | 4,14 | 1 | 0,81 | 0 | 0,00 | -49,4% | - | - |
| Дифтерия | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Коклюш | 8 | 1,29 | 7 | 5,51 | 7 | 6,52 | 1 | 0,16 | 1 | 0,81 | 1 | 0,92 | +7сл. | +6сл. | +6сл. |
| Корь | 1 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | +1сл. | - | - |
| Краснуха | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Паротит эпидемический | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Генерализованные формы менингококковой инфекции | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Ветряная оспа | 249 | 40,11 | 237 | 186,47 | 234 | 217,80 | 128 | 20,37 | 117 | 94,48 | 117 | 107,23 | 2,0р. | 2,0р. | 2,0р. |
| Туляремия | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Сибирская язва | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Бруцеллез, впервые выявленный | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Вирусные и геморрагические лихорадки | 6 | 0,97 | 1 | 0,79 | 1 | 0,93 | 11 | 1,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -5сл. | +1сл. | +1сл. |
| Гнила | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Крымская геморр. лихорадка | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| ГЛПС | 6 | 0,97 | 1 | 0,79 | 1 | 0,93 | 11 | 1,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -5сл. | +1сл. | +1сл. |
| Клещевой весенне-летний | 7 | 1,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 1,59 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -3сл. | - | - |
| Клещевой боррелиоз (болезнь | 21 | 3,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 | 2,39 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 41,7% | - | - |
| Псевдотуберкулез | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Лептоспироз | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Бешенство | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 149 | 24,00 | 50 | 39,34 | 50 | 46,54 | 166 | 26,42 | 63 | 50,87 | 54 | 49,49 | -9,1% | -22,7% | -4сл. |
| из них укусы нанесенные сабаками | 109 | 17,56 | 44 | 34,62 | 44 | 40,95 | 105 | 16,71 | 51 | 41,18 | 45 | 41,24 | +4сл. | -15,9% | -1сл. |
| Укусы клешами | 1978 | 318,63 | 266 | 209,29 | 222 | 206,63 | 955 | 151,97 | 136 | 109,82 | 109 | 99,90 | 2,1р. | 2,0р. | 2,0р. |
| Риккетсиозы | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| из них: эпидемический сыпной | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| болезнь Бриля | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| лихорадка Ку | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| сибирский клещевой тиф | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| астраханская пятнистая | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| гранулоцитарный анаплазмоз человека | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| моноцитарный эрлихиоз | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Педикулез | 4 | 0,64 | 3 | 2,36 | 3 | 2,79 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | +4сл. | +3сл. | +3сл. |
| Туберкулез (впервые | 9 | 1,45 | 1 | 0,79 | 1 | 0,93 | 12 | 1,91 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -24,1% | +1сл. | +1сл. |
| в том числе туберкулез органов дыхания | 8 | 1,29 | 1 | 0,79 | 1 | 0,93 | 12 | 1,91 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -32,5% | +1сл. | +1сл. |
| из них бактериальные формы | 3 | 0,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,64 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1сл. | - | - |
| Сифилис (впервые выявленный) все формы | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -3сл. | - | - |
| Гонококковая инфекция | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Болезнь, вызванная ВИЧ и бессимптомный инфекционный статус, вызванный ВИЧ | 16 | 2,58 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 28 | 4,46 | 1 | 0,81 | 1 | 0,92 | -42,2% | -1сл. | -1сл. |
| Острые ИВДП множественной или неуточненной локализации | 6667 | 1074,0 | 4199 | 3303,8 | 3724 | 3466,1 | 7226 | 1149,9 | 4705 | 3799,4 | 4512 | 4135,4 | -6,6% | -13,0% | -16% |
| Грипп | 1 | 0,16 | 1 | 0,79 | 1 | 0,93 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | +1сл. | +1сл. | +1сл. |
| Пневмония (внебольничная) | 160 | 25,77 | 39 | 30,69 | 34 | 31,65 | 97 | 15,44 | 26 | 21,00 | 25 | 22,91 | 67,0% | 46,1% | 38% |
| COVID-19, всего | 34 | 5,48 | 1 | 0,79 | 1 | 0,93 | 277 | 44,1 | 20 | 16,15 | 15 | 13,75 | -8,0р. | -20,4р. | -14,8р. |
| из него: пневмонии вирусом COVID-19, вирус идентифицирован | 4 | 0,64 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 | 2,39 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -3,7р. | - | - |
| нос-тво возбуд. COVID-19 | 4 | 0,64 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 33 | 5,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -8,2р. | - | - |
| Малярия впервые выявленная | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Трихинеллез | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Поствакцинальные осложнения | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,16 | 1 | 0,81 | 1 | 0,92 | -1сл. | -1сл. | -1сл. |