

Сведения об инфекционной и паразитарной заболеваемости в Костромской области за август 2014-2013гг.

	2014						2013						рост, снижение (%)		
	всего	на 100 тыс.	от 0 до 17 лет	на 100 тыс.	от 0 до 14 лет	на 100 тыс.	всего	на 100 тыс.	от 0 до 17 лет	на 100 тыс.	от 0 до 14 лет	на 100 тыс.	всего	от 0 до 17 лет	от 0 до 14 лет
Брюшной тиф	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Другие сальмонеллезные инфекции	5	0,76	2	1,65	2	1,94	45	6,80	8	6,71	8	7,96	-40сл.	-6 сл.	-6 сл.
Бактериальная дизентерия (шигеллез)	1	0,15	0	0,00	0	0,00	2	0,30	1	0,84	1	0,99	-1 сл.	-1 сл.	-1 сл.
ОКИ, вызванные установленными возбудителями	27	4,10	21	17,36	20	19,41	46	6,95	28	23,48	28	27,85	-41,0%	-26,1%	-30,3%
ОКИ, вызван. неустановлен. возбудителями	196	29,75	111	91,77	107	103,83	200	30,22	94	78,82	88	87,53	-1,6%	16,4%	18,6%
Острый паралитический полиомиелит, включая ассоциированный с вакциной	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Острые вялые параличи	1	0,15	1	0,83	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00	+1 сл.	+1 сл.	+1 сл.
Энтеровирусные инфекции	1	0,15	1	0,83	1	0,97	3	0,45	3	2,52	3	2,98	-2 сл.	-2 сл.	-2 сл.
из них: энтеровирусный менингит	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,15	1	0,84	1	0,99	-1 сл.	-1 сл.	-1 сл.
Острые вирусные гепатиты – всего	5	0,76	1	0,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	+5 сл.	+1 сл.	-
из них: острый гепатит А	2	0,30	1	0,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	+2 сл.	+1 сл.	-
острый гепатит В	1	0,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	+1 сл.	-	-
острый гепатит С	2	0,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	+2 сл.	-	-
острый гепатит Е	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Хронические вирусные гепатиты (впервые)	17	2,58	0	0,00	0	0,00	19	2,87	0	0,00	0	0,00	-10,1%	-	-
из них: хронический гепатит В	12	1,82	0	0,00	0	0,00	2	0,30	0	0,00	0	0,00	+10сл.	-	-
хронический гепатит С	1	0,15	0	0,00	0	0,00	17	2,57	0	0,00	0	0,00	-16сл.	-	-
Носительство возбудителя вирусного гепатита В	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Дифтерия	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Коклюш	3	0,46	3	2,48	3	2,91	0	0,00	0	0,00	0	0,00	+3сл.	+3сл.	+3сл.
Корь	1	0,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Краснуха	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Паротит эпидемический	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Менингококковая инфекция	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,45	3	2,52	3	2,98	-3сл.	-3сл.	-3сл.
из нее: генерализованные формы	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,45	3	2,52	3	2,98	-3сл.	-3сл.	-3сл.
Ветряная оспа	121	18,36	115	95,07	109	105,77	110	16,62	106	88,9	104	103,4	10,5%	7,0%	2,2%
Туляремия	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Сибирская язва	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Бруцеллез, впервые выявленный	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Вирусные и геморрагические лихорадки	17	2,58	1	0,83	1	0,97	2	0,30	0	0,00	0	0,00	+15сл.	+1 сл.	+1 сл.
из них:лихорадка Западного Нила	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Крымская гемор. лихорадка	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
ГЛПС	17	2,58	1	0,83	1	0,97	2	0,30	0	0,00	0	0,00	+15сл.	+1 сл.	+1 сл.
Клещевой весенне-летний энцефалит	2	0,30	1	0,83	1	0,97	3	0,45	0	0,00	0	0,00	-1 сл.	+1 сл.	+1 сл.
Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма)	6	0,91	0	0,00	0	0,00	4	0,60	0	0,00	0	0,00	+2 сл.	-	-
Псевдотуберкулез	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Легтоспироз	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Бешенство	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Укусы, ослонения, оцарапывания животными	107	16,24	42	34,72	37	35,90	112	16,92	35	29,35	34	33,82	-4,0%	18,3%	6,2%
Укусы клещами	103	15,63	39	32,24	13	12,61	58	8,76	20	16,77	20	19,89	78,4%	92,2%	-36,6%
Риккетсиозы	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
из них: эпидемический сыпной тиф	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
болезнь Бриля	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
лихорадка Ку	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
сибирский клещевой тиф	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
астраханская пятнистая лихорадка	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
гранулоцитарный анаплазмоз человека	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
моноцитарный эрлихиоз человека	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Педикулез	10	1,52	7	5,79	6	5,82	14	2,12	4	3,35	2	1,99	-28,3%	+3 сл.	+4 сл.
Туберкулез (впервые выявленный) активные формы	8	1,21	1	0,83	1	0,97	11	1,66	0	0,00	0	0,00	-27,0%	+1 сл.	+1 сл.
в т.ч. туберкулез органов дыхания	7	1,06	1	0,83	1	0,97	11	1,66	0	0,00	0	0,00	-36,1%	+1 сл.	+1 сл.
из них: бациллярные формы	2	0,30	0	0,00	0	0,00	8	1,21	0	0,00	0	0,00	-6 сл.	-	-
Сифилис (впервые выявленный) все формы	3	0,46	0	0,00	0	0,00	3	0,45	0	0,00	0	0,00	=	-	-
Гонokokковая инфекция	1	0,15	0	0,00	0	0,00	8	1,21	2	1,68	1	0,99	-7 сл.	-2 сл.	-1 сл.
Болезнь, вызванная ВИЧ и бессимптомный инфекционный статус, вызванный ВИЧ	21	3,19	1	0,83	0	0,00	16	2,42	0	0,00	0	0,00	31,8%	+1 сл.	-
ОРВИ	8141	1235,53	6637	5486,98	6545	6351,16	9016	1362,42	6914	5797,76	6802	6765,94	-9,3%	-5,4%	-6,1%
Грипп	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Пневмония (внебольничная)	77	11,69	24	19,84	24	23,29	85	12,84	45	37,73	44	43,77	-9,0%	-90,2%	-87,9%
Малярия впервые выявленная	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Трихинеллез	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Поствакцинальные осложнения	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-