

Сведения об инфекционной и паразитарной заболеваемости в Костромской области за январь 2016-2015гг.

| | 2016 | | | | | | 2015 | | | | | | рост, снижение (%) | | |
|---|-------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|
| | всего | на 100 тыс. | от 0 до 17 лет | на 100 тыс. | от 0 до 14 лет | на 100 тыс. | всего | на 100 тыс. | от 0 до 17 лет | на 100 тыс. | от 0 до 14 лет | на 100 тыс. | всего | от 0 до 17 лет | от 0 до 14 лет |
| Брюшной тиф | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Другие сальмонеллезные | 9 | 1,38 | 2 | 1,60 | 2 | 1,85 | 6 | 0,91 | 2 | 1,62 | 2 | 1,90 | +3сл. | = | = |
| Бактериальная дизентерия | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1сл. | - | - |
| ОКИ, вызванные установленными возбудителями | 59 | 9,02 | 51 | 40,68 | 48 | 44,45 | 96 | 14,63 | 67 | 54,43 | 64 | 60,69 | -38,4% | -25,3% | -26,8% |
| ОКИ, вызван. неустановлен. возбудителями | 198 | 30,26 | 128 | 102,09 | 118 | 109,26 | 326 | 49,67 | 217 | 176,30 | 212 | 201,03 | -39,1% | -42,1% | -45,6% |
| Острый паралитический | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Острые вялые параличи | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Энтеровирусные инфекции | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| из них: энтеровирусный | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Острые вирусные гепатиты – | 3 | 0,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | = | - | - |
| из них: острый гепатит А | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1сл. | - | - |
| острый гепатит В | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| острый гепатит С | 3 | 0,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | +3сл. | - | - |
| острый гепатит Е | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1сл. | - | - |
| Хронические вирусные гепатиты | 21 | 3,21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25 | 3,81 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -15,7% | - | - |
| из них: хронический гепатит В | 4 | 0,61 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 | 2,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -3,7р. | - | - |
| хронический гепатит С | 15 | 2,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 1,52 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50,5% | - | - |
| Носительство возбудителя вирусного гепатита В | 2 | 0,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | +1сл. | - | - |
| Дифтерия | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Коклюш | 1 | 0,15 | 1 | 0,80 | 1 | 0,93 | 3 | 0,46 | 3 | 2,44 | 3 | 2,84 | -2сл. | -2сл. | -2сл. |
| Корь | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Краснуха | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Паротит эпидемический | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Менингококковая инфекция | 1 | 0,15 | 1 | 0,80 | 1 | 0,93 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | +1сл. | +1сл. | +1сл. |
| из нее: генерализованные | 1 | 0,15 | 1 | 0,80 | 1 | 0,93 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | +1сл. | +1сл. | +1сл. |
| Ветряная оспа | 706 | 107,89 | 670 | 534,38 | 656 | 607,43 | 814 | 124,01 | 770 | 625,58 | 749 | 710,25 | -13,0% | -14,6% | -14,5% |
| Туляремия | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Сибирская язва | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Бруцеллез, впервые выявленный | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Вирусные и геморрагические лихорадки | 13 | 1,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 35 | 5,33 | 2 | 1,62 | 1 | 0,95 | -2,7р. | -2сл. | -1сл. |
| Нила | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Крымская геморр. лихорадка | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| ГЛПС | 13 | 1,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 35 | 5,33 | 2 | 1,62 | 1 | 0,95 | -2,7р. | -2сл. | -1сл. |
| Клещевой весенне-летний | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Клещевой боррелиоз (болезнь | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Псевдотуберкулез | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Лептоспироз | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Бешенство | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Укусы, ослонения, оцарапывания животными | 84 | 12,84 | 16 | 12,76 | 12 | 11,11 | 72 | 10,97 | 23 | 18,69 | 19 | 18,02 | 17,0% | -31,7% | -38,3% |
| Укусы клещами | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Риккетсиозы | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| из них: эпидемический сыпной | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| болезнь Брилля | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| лихорадка Ку | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| сибирский клещевой тиф | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| астраханская пятнистая | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| гранулоцитарный анаплазмоз человека | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| моноцитарный эрлихиоз | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Педикулез | 46 | 7,03 | 36 | 28,71 | 35 | 32,41 | 44 | 6,70 | 32 | 26,00 | 30 | 28,45 | 4,9% | 10,4% | 13,9% |
| Туберкулез (впервые) | 11 | 1,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 2,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -31,0% | - | - |
| в том числе туберкулез органов дыхания | 11 | 1,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 2,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -31,0% | - | - |
| из них бациллярные формы | 7 | 1,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 1,37 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -22,0% | - | - |
| Сифилис (впервые выявленный) все формы | 2 | 0,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,61 | 1 | 0,81 | 0 | 0,00 | -2сл. | -1сл. | - |
| Гонококковая инфекция | 1 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 1,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -6сл. | - | - |
| Болезнь, вызванная ВИЧ и бессимптомный инфекционный статус, вызванный ВИЧ | 16 | 2,45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11 | 1,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 45,9% | - | - |
| Острые ИВДП множественной или неуточненной локализации | 25702 | 3927,6 | 19605 | 15636,5 | 18185 | 16838,6 | 22820 | 3476,6 | 18322 | 14885,6 | 17044 | 16162,2 | 13,0% | 5,0% | 4,2% |
| Грипп | 53 | 8,10 | 29 | 23,13 | 28 | 25,93 | 11 | 1,68 | 5 | 4,06 | 3 | 2,84 | 4,8р. | 5,6р. | 9,1р. |
| Пневмония (внебольничная) | 317 | 48,44 | 122 | 97,30 | 114 | 105,56 | 239 | 36,41 | 83 | 67,43 | 76 | 72,07 | 33,0% | 44,3% | 46,5% |
| Малярия впервые выявленная | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Трихинеллез | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Поствакцинальные осложнения | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |