

Сведения об инфекционной и паразитарной заболеваемости в Костромской области за сентябрь 2019-2018гг.

| | 2019 | | | | | | 2018 | | | | | | рост, снижение (%) | | |
|---|-------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|
| | всего | на 100 тыс. | от 0 до 17 лет | на 100 тыс. | от 0 до 14 лет | на 100 тыс. | всего | на 100 тыс. | от 0 до 17 лет | на 100 тыс. | от 0 до 14 лет | на 100 тыс. | всего | от 0 до 17 лет | от 0 до 14 лет |
| Брюшной тиф | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Другие сальмонеллезные | 9 | 1,40 | 1 | 0,77 | 0 | 0,00 | 11 | 1,70 | 7 | 5,40 | 7 | 6,26 | -2сл. | -6сл. | -7сл. |
| Бактериальная дизентерия | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| ОКИ, вызванные уст. возбуд. | 58 | 9,02 | 45 | 34,50 | 38 | 33,89 | 46 | 7,10 | 31 | 23,92 | 29 | 25,94 | 27,0% | 44,2% | 31% |
| ОКИ, вызван. неуст. возбуд. | 164 | 25,49 | 119 | 91,23 | 106 | 94,54 | 321 | 49,53 | 119 | 91,84 | 110 | 98,39 | -48,5% | = | -4сл. |
| Острый параличический | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Острые вялые параличи | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Энтеровирусные инфекции | 17 | 2,64 | 17 | 13,03 | 17 | 15,16 | 17 | 2,62 | 17 | 13,12 | 17 | 15,21 | = | = | = |
| из них: энтеровирусный | 3 | 0,47 | 3 | 2,30 | 3 | 2,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | +3сл. | +3сл. | +3сл. |
| Острые вирусные гепатиты – | 2 | 0,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,62 | 2 | 1,54 | 2 | 1,79 | -2сл. | -2сл. | -2сл. |
| из них: острый гепатит А | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,46 | 2 | 1,54 | 2 | 1,79 | -3сл. | -2сл. | -2сл. |
| острый гепатит В | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| острый гепатит С | 2 | 0,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | +1сл. | - | - |
| острый гепатит Е | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Хронические вирусные гепатиты | 23 | 3,58 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25 | 3,86 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2сл. | - | - |
| из них: хронический гепатит В | 4 | 0,62 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 0,93 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2сл. | - | - |
| хронический гепатит С | 19 | 2,95 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 19 | 2,93 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | = | - | - |
| Носительство возбудителя вирусного гепатита В | 1 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | +1сл. | - | - |
| Дифтерия | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Коклюш | 6 | 0,93 | 5 | 3,83 | 5 | 4,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | +6сл. | +5сл. | +5сл. |
| Корь | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Краснуха | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Паротит эпидемический | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Менингококковая инфекция | 2 | 0,31 | 1 | 0,77 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | +2сл. | +1сл. | - |
| из нее: генерализованные | 2 | 0,31 | 1 | 0,77 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | +2сл. | +1сл. | - |
| Ветряная оспа | 248 | 38,55 | 238 | 182,46 | 233 | 207,81 | 80 | 12,34 | 75 | 57,88 | 71 | 63,51 | в 3,1р. | в 3,1р. | в 3,3р. |
| Туляремия | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Сибирская язва | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Бруцеллез, впервые выявленный | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Вирусные и геморрагические лихорадки | 17 | 2,64 | 1 | 0,77 | 1 | 0,89 | 5 | 0,77 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | в 3,4р. | - | - |
| Нила | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Крымская геморр. лихорадка | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| ГЛПС | 17 | 2,64 | 1 | 0,77 | 1 | 0,89 | 5 | 0,77 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | в 3,4р. | - | - |
| Клещевой весенне-летний | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1сл. | - | - |
| Клещевой боррелиоз (болезнь | 2 | 0,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | = | - | - |
| Псевдотуберкулез | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Лептоспироз | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Бешенство | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Укусы, ослонения, оцарапывания животными | 122 | 18,96 | 51 | 39,10 | 50 | 44,60 | 113 | 17,43 | 38 | 29,33 | 36 | 32,20 | 8,8% | 33,3% | 38% |
| Укусы клещами | 68 | 10,57 | 10 | 7,67 | 10 | 8,92 | 52 | 8,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 31,8% | +10сл. | +10сл. |
| Риккетсиозы | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| из них: эпидемический сыпной | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| болезнь Брилла | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| лихорадка Ку | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| сибирский клещевой тиф | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| астраханская пятнистая | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| гранулоцитарный анаплазмоз человека | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| моноцитарный эрлихиоз | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Педикулез | 50 | 7,77 | 44 | 33,73 | 42 | 37,46 | 36 | 5,55 | 33 | 25,47 | 33 | 29,52 | 39,9% | 32,5% | 27% |
| Туберкулез (впервые | 6 | 0,93 | 2 | 1,53 | 2 | 1,78 | 5 | 0,77 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | +1сл. | +2сл. | +2сл. |
| в том числе туберкулез органов дыхания | 6 | 0,93 | 2 | 1,53 | 2 | 1,78 | 5 | 0,77 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | +1сл. | +2сл. | +2сл. |
| из них бациллярные формы | 3 | 0,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | +1сл. | - | - |
| Сифилис (впервые выявленный) все формы | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2сл. | - | - |
| Гонококковая инфекция | 3 | 0,47 | 1 | 0,77 | 0 | 0,00 | 4 | 0,62 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1сл. | +1сл. | - |
| Болезнь, вызванная ВИЧ и бессимптомный инфекционный статус, вызванный ВИЧ | 20 | 3,11 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 34 | 5,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -40,7% | - | - |
| Острые ИВДП множественной или неуточненной локализации | 20750 | 3225,4 | 16131 | 12366,4 | 14610 | 13030,8 | 20822 | 3212,5 | 16129 | 12447,3 | 14304 | 12794,7 | 0,4% | +2сл. | 2% |
| Грипп | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Пневмония (внебольничная) | 189 | 29,38 | 68 | 52,13 | 60 | 53,51 | 242 | 37,34 | 69 | 53,25 | 60 | 53,67 | -21,3% | -1сл. | = |
| Малярия впервые выявленная | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Трихинеллез | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Поствакцинальные осложнения | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |