Сведения об инфекционной и паразитарной заболеваемости в Костромской области за **май** 2020-2019гг.

| | 2020 | | | | | | 2019 | | | | | | рост, снижение ( % ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | всего | на 100 тыс. | от 0 до 17 лет | на 100 тыс. | от 0 до 14 лет | на 100 тыс. | всего | на 100 тыс. | от 0 до 17 лет | на 100 тыс. | от 0 до 14 лет | на 100 тыс. | всего | от 0 до 17 лет | от 0 до 14 лет |
| Брюшной тиф | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Другие сальмонеллезные | 2 | 0,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 1,24 | 5 | 3,83 | 5 | 4,46 | -6сл. | -5сл. | -5сл. |
| Бактериальная дизентерия | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| ОКИ, вызванные уст. возбуд. | 10 | 1,57 | 5 | 3,84 | 5 | 4,49 | 60 | 9,33 | 32 | 24,53 | 31 | 27,65 | -83,2% | -84,4% | -84% |
| ОКИ, вызван. неуст. возбуд. | 89 | 13,97 | 60 | 46,05 | 58 | 52,12 | 209 | 32,49 | 135 | 103,49 | 128 | 114,16 | -57,0% | -55,5% | -54% |
| Острый паралитический | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Острые вялые параличи | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Энтеровирусные инфекции | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| из них: энтеровирусный | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Острые вирусные гепатиты – | 2 | 0,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | = | - | - |
| из них: острый гепатит А | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1сл. | - | - |
| острый гепатит В | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| острый гепатит С | 2 | 0,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | +1сл. | - | - |
| острый гепатит Е | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | = | - | - |
| Хронические вирусные гепатиты | 21 | 3,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 45 | 6,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -52,9% | - | - |
| из них: хронический гепатит В | 1 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 | 2,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -14сл. | - | - |
| хронический гепатит С | 20 | 3,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30 | 4,66 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -32,7% | - | - |
| Дифтерия | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Коклюш | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,78 | 5 | 3,83 | 4 | 3,57 | -5сл. | -5сл. | -4сл. |
| Корь | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2сл. | - | - |
| Краснуха | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Паротит эпидемический | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Генерализованные формы менингококковой инфекции | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,31 | 1 | 0,77 | 1 | 0,89 | -2сл. | -1сл. | -1сл. |
| Ветряная оспа | 51 | 8,00 | 46 | 35,30 | 41 | 36,84 | 631 | 98,08 | 604 | 463,04 | 582 | 519,09 | -91,8% | -92,4% | -93% |
| Туляремия | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Сибирская язва | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Бруцеллез, впервые выявленный | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Вирусные и геморрагические лихорадки | 4 | 0,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | +2сл. | - | - |
| Нила | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Крымская геморр. лихорадка | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| ГЛПС | 4 | 0,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | +2сл. | - | - |
| Клещевой весенне-летний | 1 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2сл. | - | - |
| Клещевой боррелиоз (болезнь | 4 | 0,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 0,93 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2сл. | - | - |
| Псевдотуберкулез | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Лептоспироз | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Бешенство | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 116 | 18,20 | 37 | 28,40 | 32 | 28,76 | 143 | 22,23 | 57 | 43,70 | 50 | 44,60 | -18,1% | -35,0% | -36% |
| Укусы клещами | 3319 | 520,82 | 1007 | 772,85 | 904 | 812,37 | 4818 | 748,92 | 1064 | 815,69 | 925 | 825,02 | -30,5% | -5,3% | -2% |
| Риккетсиозы | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| из них: эпидемический сыпной | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| болезнь Брилля | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| лихорадка Ку | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| сибирский клещевой тиф | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| астраханская пятнистая | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| гранулоцитарный анаплазмоз человека | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| моноцитарный эрлихиоз | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Педикулез | 4 | 0,63 | 1 | 0,77 | 1 | 0,90 | 25 | 3,89 | 22 | 16,87 | 20 | 17,84 | -83,8% | -95,4% | -95% |
| Туберкулез (впервые | 4 | 0,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 1,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -5сл. | - | - |
| в том числе туберкулез органов дыхания | 4 | 0,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 1,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -5сл. | - | - |
| из них бациллярные формы | 1 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 0,93 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -5сл. | - | - |
| Сифилис (впервые выявленный) все формы | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Гонококковая инфекция | 2 | 0,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | = | - | - |
| Болезнь, вызванная ВИЧ и бессимптомный инфекционный статус, вызванный ВИЧ | 11 | 1,73 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 24 | 3,73 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | -53,7% | - | - |
| Острые ИВДП множественной или неуточненной локализации | 4393 | 689,3 | 1892 | 1452,1 | 1473 | 1323,7 | 12170 | 1891,7 | 8782 | 6732,5 | 7799 | 6956,0 | -63,6% | -78,4% | -81% |
| Грипп | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,3 | 1 | 0,8 | 1 | 0,9 | -2сл. | -1сл. | -1сл. |
| Пневмония (внебольничная) | 248 | 38,92 | 23 | 17,65 | 20 | 17,97 | 180 | 27,98 | 55 | 42,16 | 51 | 45,49 | 39,1% | -58,1% | -60% |
| Малярия впервые выявленная | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Трихинеллез | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Поствакцинальные осложнения | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |